





§L3H §L3H -§

## Slik BRUKER du EpiPen®/EpiPen® Jr

Ta ut EpiPen®/EpiPen® Jr fra beskyttelseshylsteret. Legg deg ned med bena litt hevet for å holde blodsirkulasjonen i gang eller sett de opp vis det er vanskelig å p ste.

1.



Hold EpiPen®/EpiPen® Jr i en ineren e n en e en re n r e en i er e e en n ne en r n EpiPen®/EpiPen® Jr re en i er e e en e re e en re pp e en n re n en. **Husk: "Blått mot himmelen, oransje mot låret".**

2.



EpiPen®/EpiPen® Jr r er i en re en r n e ppen pe e er i en re

3.



Støt EpiPen®/EpiPen® Jr r i i en re i rere i i EpiPen®/EpiPen® Jr r i re in e r er re i e n er

4.



EpiPen®/EpiPen® Jr re e e p en i er e e r n e i er e e e ren e i e ern en

5.



er in e n e e r i i i e n er in p re er n e pp i n i

Hver EpiPen®/EpiPen® Jr kan kun brukes én gang. Dersom symptomene ikke blir bedre, kan du administrere ytterligere en EpiPen®/EpiPen® Jr etter 5-15 minutter.

DLN233

§L3H §L3H

- Oppbevar EpiPen®/EpiPen® Jr ved høyst 25° C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryser.
- Oppbevar beholderen i ytterpakningen for å beskytte mot lys. Hvis adrenalin eksponeres for sollys vil det hurtig forringes og bli rosa eller brunt.
- Husk å kontrollere innholdet i inspeksjonsviduet på EpiPen®/EpiPen® Jr av og til for å være sikker på at væsken fremdeles er klar og fargeløs.
- EpiPen®/EpiPen® Jr skal byttes ut ved utløpsdatoen eller tidligere dersom oppløsningen er misfarget eller inneholder bunnfall (partikler).